

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MANIPULATION DES EXCRETAS DES PATIENTS RECEVANT UN TRAITEMENT ANTICANCEREUX EN ETABLISSEMENT DE SANTE.

Seules les données faisant référence aux RCP sont opposables. Les informations contenues dans ce document doivent être validées par la pharmacie et la médecine du travail de l'établissement.

La seule toxicité prouvée est une toxicité locale (toxicité de contact).

Des mesures de protection vestimentaires sont donc indispensables pour la manipulation des excréta (selles, urines et vomissements quand le traitement est administré par voie orale) :

- Porter des gants (une ou 2 paires)
- Porter une blouse à poignets serrés. (Ne jamais manipuler des excréta avec un vêtement à manches courtes.)

La tenue de protection doit être **dédiée** à la réalisation des tâches qui exposent à un risque de contact avec les excréta. Elle ne doit **jamais être utilisée pour réaliser d'autres actes**.
Changer la blouse tous les jours.

Lors de la manipulation des déchets liquides avec **risque de projection** (ex: les urines...) :

- Porter des lunettes de protection
- Porter un masque chirurgical
- Porter une charlotte à usage unique

Après avoir ôté la tenue de protection, procéder à un **lavage simple des mains**.

Le matériel de protection vestimentaire à usage unique est éliminé via la **filière DASRI (Ecobox®)**.

La monture et la visière des lunettes de protection doivent être **décontaminés tous les jours** (eau savonneuse ou détergent).

Matériel de recueil des excréta :

Le matériel de recueil doit être **à usage unique**, si possible, ou en **inox**.

Rincer abondamment à l'eau du robinet après utilisation, nettoyer avec un détergent puis rincer.

Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments et risque d'altération de l'acier inoxydable).

Evacuation des excréta :

Les excréta (urines, selles, vomissements) sont évacués dans les toilettes.

Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise.

Les draps et le linge souillés doivent être manipulés avec des **gants** et être **lavés séparément et immédiatement à température élevée (au moins 60°C)**.

Les protections d'incontinence sont éliminées dans la filière DASRI.

Durée pendant laquelle il faut respecter ces mesures de protection :

Cette durée varie en fonction du médicament (voir tableau ci-dessous), de la durée de la cure, des traitements associés, du terrain du patient (insuffisance rénale, hépatique...) et de son transit digestif (diarrhée, constipation).

En l'absence de données, notamment pour les thérapies ciblées, une protection minimale de 48h vis à vis des urines et 5 à 7 jours vis à vis des fèces est recommandée.

Voir le tableau pour plus de précisions.

Que faire en cas de contact avec les excréta ?

Rincer abondamment les zones corporelles après contact accidentel avec les excréta.

Rappel concernant la gestion des déchets :

Le matériel de perfusion (tubulures, poches de perfusion), les blisters et les boîtes des médicaments anticancéreux doivent être éliminés via la filière DASRI.

Les flacons de principe actifs doivent être incinérés à 1200°C.

DCI	Durée nécessaire des mesures de protection (en jours)		Remarques
	Urines	Selles	
Altrétamine	3	0	Per os : prudence en cas de vomissements
Amsacrine	3	2	-
Asparaginase	NR	NR	-
Azacytidine	1	-	-
BCG	6	-	Instillation vésicale : uriner en position assise
Bexarotène	NR	NR	Per os : prudence en cas de vomissements
Bléomycine	3	-	-
Busulfan	1 à 2	inutile	Per os : prudence en cas de vomissements
Capécitabine	1	NR	Per os : prudence en cas de vomissements
Carboplatine	1 à 3	-	-
Carmustine	3 à 4	-	Voie locale parfois
Chlorambucil	2	-	Per os : prudence en cas de vomissements
Chlorméthine	NR	NR	-
Cisplatine	7	7	-
Cladribine	3 à 5	5	-
Cyclophosphamide	3 à 4	6 à 7	Excrétion dans la salive et la sueur
Cytarabine	1	NR	-
Dacarbazine	1 à 2	-	-
Dactinomycine	5 à 7	8	-
Daunorubicine	2 à 6	7	Coloration des urines en rouge
Docétaxel	3	3 à 7	-
Doxorubicine	6	7	Coloration des urines en rouge
Doxorubicine liposomale	5	7	-
Epirubicine	3 à 7	5 à 7	Coloration des urines en rouge
Etoposide	3 à 4	5 à 7	Per os : prudence en cas de vomissements
Etoposide phosphate	5	NR	-
Fludarabine	3 à 5	NR	Per os : prudence en cas de vomissements
Fluorouracile	1 à 2	1 à 5	Per os : prudence en cas de vomissements
Fotémustine	2	2	-
Gemcitabine	1 à 3	3	-
Hydroxycarbamide Hydroxyurée	2	-	Per os : prudence en cas de vomissements
Idarubicine	3 à 4	2 à 8	Per os : prudence en cas de vomissements Coloration des urines en rouge pendant 1 à 2 jours
Ifosfamide	2 à 4	7	-
Imatinib mésylate	-	7	-
Irinotécan	4	4	-
Lomustine	3 à 4	1	Per os : prudence en cas de vomissements
Melphalan	2	6 à 7	Per os : prudence en cas de vomissements
Mercaptopurine	2	5	Per os : prudence en cas de vomissements

DCI	Durée nécessaire des mesures de protection (en jours)		Remarques
	Urines	Selles	
Méthotrexate	3	7	Per os : prudence en cas de vomissements Présent dans la salive
Miltéfosine	NR	NR	-
Mitoguazone	NR	NR	-
Mitomycine	3 heures à 3 jours	7	Instillation vésicale : uriner en position assise
Mitoxantrone	6	7	Coloration des urines en bleu-vert
Oxaliplatine	4	-	-
Paclitaxel	7	7	-
Pemetrexed	NR	NR	-
Pentostatine	4	0	-
Pirarubicine	3	6	Coloration des urines en bleu-vert
Procarbazine	2 à 3	-	-
Ralitrexed	5 à 10	10	-
Streptozocine	3	-	-
Tégafur - Uracile	NR	NR	Per os : prudence en cas de vomissements
Temozolomide	2	-	Per os : prudence en cas de vomissements
Thioguanine	1 à 5	0 à 5	Per os : prudence en cas de vomissements
Thiotépa	2 à 3	NR	Instillation vésicale : uriner en position assise
Topotécan	1 à 7	-	Per os : prudence en cas de vomissements
Trétinoïne	NR	NR	Per os : prudence en cas de vomissements
Trioxyde d'arsenic	NR	NR	-
Vinblastine	4	4 à 7	Précautions prolongées au delà de 7 jours pour les selles en cas de constipation induite.
Vincristine	4	7 à 10	
Vindésine	4	5 à 7	
Vinorelbine	4	7	

Données disponibles CNIMH 2008

EXCRETAS DES PATIENTS SOUS ANTICANCEREUX



TOXICITE DE CONTACT

➤ POUR MANIPULER TOUS LES EXCRETAS



Je porte au moins une paire de gants.



Je porte une blouse à poignets serrés.

➤ POUR MANIPULER LES EXCRETAS LIQUIDES (RISQUE DE PROJECTION) ...



Je porte des lunettes de protection.



Je porte un masque chirurgical.



Je porte une charlotte à usage unique.

➤ POUR RECUEILLIR LES EXCRETAS ...



J'utilise du matériel à usage unique ou en inox



Je n'utilise pas d'eau de Javel.

➤ APRES LA MANIPULATION,



Je jette les excréta dans les toilettes.



Je rince abondamment le matériel de recueil à l'eau du robinet. Je le lave avec un détergent et je le rince à nouveau.



Je lave immédiatement le linge souillé à haute température.



Je jette ma tenue de protection à usage unique dans la filière DASRI.



Je me lave les mains.