QUAND ET COMMENT AURAI– JE MON TRAITEMENT ?

Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable (ou PAC*).
Ce traitement sera administrée sous forme de cycles (ou cures)

Description synthétique du schéma thérapeutique:
→ Ce traitement ne nécessite pas une hospitalisation complète. Il vous sera administré en hôpital de jour.

Cycle de 15 jours



Cycle de 21 jours



Avant et après les cures, Que dois– je faire?

- → Prémédication avant les cures (patch Emla (lidocaïne))
- → Dans les jours précédant la cure, vous devrez réaliser un bilan sanguin.
- → Possibilité de report de cure en fonction des résultats biologiques et de votre état clinique.
- → Il n'est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre traitement.
- → Un contrôle urinaire vous sera demandé à votre arrivée.

*Abord veineux (PAC)

Un petit boîtier, situé sous la clavicule, appelé communément PAC ou chambre implantable, peut être mis en place par un chirurgien avant de débuter le traitement.
En cas d'apparition de rougeur, de douleur ou inflammation à ce niveau, en parler à votre médecin.

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Buvez beaucoup d'eau (au moins 1,5L par jour)
- Ce traitement ne peut être pris lors d'une grossesse ou de l'allaitement.
- Lors du traitement, il est déconseillé de s'exposer au soleil.
- Le traitement peut entraîner des troubles sexuels. Parlez–en à votre médecin ou à l'équipe soignante.
- La consommation d'alcool et de tabac est fortement déconseillée.
- Si vous prenez de l'Aprépitant (Emend), il est déconseillé de manger ou boire du pamplemousse lors du traitement
- Il est conseillé de faire de l'activité physique.
- En cas de consultation médicale, de soins dentaires ou d'hospitalisation, pensez à préciser que vous êtes sous chimiothérapie.
- Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour limiter les risques d'infections.
- Utilisez une méthode de contraception efficace lors de votre traitement. En cas de doute, parlez-en à votre médecin.
- Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas, parlez-en à votre médecin.
- Ce traitement peut interagir avec d'autres produits, plantes ou tisanes. Evitez l'automédication.
- Conservez vos activités tout en vous ménageant (pauses, siestes).

Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..)

.....
.....
.....
.....

Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas-de-Calais www.onco-npdc.fr Novembre 2017

ONCO NORD PAS-DE-CALAIS
RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

OMéDIT NORD PAS-DE-CALAIS

FICHE CONSEIL PATIENT

BEVACIZUMAB
Avastin

Ce traitement n'est pas une chimiothérapie mais un antiangiogénique. La chimiothérapie s'attaque directement à la tumeur, tandis que le Bevacizumab s'attaque aux vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur.

Ce traitement peut être administré seul ou associé

Vous retrouverez l'ensemble des fiches conseils sur:
http://www.onco-npdc.fr/outils-regionaux

Cette fiche a été délivrée par :

.....
.....
.....
.....
..

Cette fiche d'information a été réalisée par le Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord - Pas-de-Calais, en collaboration avec l'Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique (OMéDIT), les groupes régionaux d'oncologie médicale et pharmacie, d'infirmier(e)s ainsi que les Centres de Coordination en Cancérologie (3C) de la région.

Ce document ne peut se substituer à un avis médical.
En cas de doute, demandez conseils à votre équipe soignante.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Retard de cicatrisation des plaies

COMMENT PREVENIR ?

→ Programmer toute intervention prévue au minimum 3 semaines à 1 mois après le traitement par Avastin.

QUE FAIRE ?

→ En cas d'intervention en urgence, prévenir vos professionnels de santé de votre traitement (dentiste, chirurgien, ophtalmologue, etc.)

Toxicité rénale

Se manifeste par des gonflements, des tiraillements, des lourdeurs des membres, etc.

COMMENT PREVENIR ?

→ Hydratation

→ Surveillance de l'élimination des urines

QUE FAIRE ?

→ Une analyse d'urine sera effectuée avant chaque perfusion

Hypertension

se manifeste par une augmentation de votre tension artérielle, maux de tête, sensation de vertige, palpitations, bourdonnements d'oreille

COMMENT PREVENIR ?

→ Votre tension artérielle et vos pulsations seront surveillées avant et après le passage de la perfusion

→ Dormez la tête surélevée avec un oreiller par exemple

→ Limitez votre consommation de sel

QUE FAIRE ?

→ En cas d'apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin

Saignements

Souvent peu abondants mais fréquents (nez, gencives lors du brossage des dents, etc.)

QUE FAIRE ?

→ Si des saignements apparaissent au niveau de la bouche, des selles ou des urines ou en cas de douleurs abdominales importantes, consultez votre médecin.

Cette liste n'est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.
Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l'apparition de ces effets.
EN CAS DE PERSISTANCE DE L'UN DE CES EFFETS INDÉSIRABLES CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU ÉQUIPE SOIGNANTE.