

Message urgent ANSM 2020_1: Nouvelle information - Rupture de stock en mitomycine C : Attention au risque d'erreur médicamenteuse avec les spécialités importées

Le tableau suivant indique les indications prioritaires, les spécialités de 1^{ère} intention correspondantes et les alternatives le cas échéant.

Indications prioritaires	Voie d'administration	Spécialités pharmaceutiques de 1 ^{ère} intention	Alternative
Tumeur de la vessie n'infiltrant pas le muscle	Instillation endovésicale	Epirubicine	MITOMYCIN MEDAC 1 mg/mL (40 mg) importée
Cancer localement avancé du canal anal	Voie intraveineuse	MITOMYCIN MEDAC 1 mg/mL (40 mg) importée à il est impératif de respecter la concentration de 0,4 mg/mL	
Carcinomes péritonéaux d'origine digestive et pseudomyxomes péritonéaux traités par chimiothérapie hyperthermie intra-péritonéale (CHIP)	Instillation intra péritonéale	MITOMYCIN MEDAC 1 mg/mL (40 mg) importée	
Métastases hépatiques secondaires à un adénocarcinome colorectal dans le cadre d'une chimiothérapie intra-artérielle hépatique (CIAH)	Voie intra-artérielle hépatique	Oxaliplatine	MITOMYCIN MEDAC 1 mg/mL (40 mg) importée
Tumeurs de la surface oculaire	Application locale et collyre préparé par la Pharmacie à Usage Intérieur	Préparations pharmaceutiques à partir de : Interféron alfa-2b (INTRONA 10 millions d'UI/mL, solution injectable ou pour perfusion) Ou MITOCIN 20 mg importée Ou MITOMYCIN ACCORD 20 mg importée	
Chirurgie du glaucome	Application locale sur le site de la chirurgie filtrante	MITOSOL 0,2 mg/mL en ATU nominative*	