

## PATIENT COVID 19 EN SITUATION PALLIATIVE (non réanimatoire)

### PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE LA DYSPNÉE (hors détresse respiratoire asphyxiante) (Version 2 du 31/03/2020)



Patient sans voie d'abord injectable possible (voie IV/SC à privilégier)

#### Symptômes cliniques

**Autoévaluation par le patient de la dyspnée ressentie** : utilisation des échelles EN, EVS

Évaluer le retentissement de cette gêne sur l'autonomie et la communication

**Polypnée** : Fr > 25/min

**La posologie la plus basse proposée doit être utilisée en particulier chez les personnes âgées fragiles.**

Les fourchettes de posologie proposées permettent de s'adapter à la situation clinique et à l'âge du patient.

#### Patient naïf de morphine/oxycodone

**Morphine** (Actiskenan®, Oramorph®) 5 à 10mg  
ou **Oxynorm**® 5 mg

ET

Dose de fond : **Skenan**® LP 10 à 20mg x2/j ou **Oxycontin**® 5 à 10 mg x 2/j

+ **interdoses de 1/10 à 1/6<sup>e</sup>** de la dose de fond **toutes les heures si nécessaire**

#### Patient déjà sous morphine/oxycodone

Administrer une **interdose de 1/10 à 1/6<sup>e</sup>** de la dose de fond

ET

**Augmenter de 30 à 50%** :

- **la dose de fond** en 2 prises par jour
- Et**
- **les interdoses** avec la possibilité d'une prise toutes les heures si nécessaire

Jusqu'à 10 < Fr < 20 ou autoévaluation correcte de la dyspnée.

#### Si et seulement si aucune possibilité de prise orale et en cas d'absence de voie d'abord

**Fentanyl patch** 12 à 25 µg/h

**Fentanyl patch équivalent<sup>1</sup>** à la dose de fond oral imprenable avec possibilité d'augmenter de 30 à 50%

**ET** interdoses Oxynormo® équivalente de 1/10 à 1/6<sup>e</sup> de la dose de fond toutes les heures si nécessaires  
Jusqu'à 10 < Fr < 20 ou autoévaluation correcte de la dyspnée.

#### ET ASSOCIATION À UNE BENZODIAZÉPINE ORALE

Seresta® (oxazepam) 10 à 20 mg en sublingual toutes les 4 heures si nécessaire.

Temesta® (lorazepam) 0,5 à 1 mg en sublingual toutes les 4 heures si nécessaire.

Valium® (diazepam) 5 mg ou 15 gouttes toutes les 6 heures si nécessaire. (30 gouttes = 10 mg)

Lyzanxia® (prazepam) 5 à 10 mg ou 10 à 20 gouttes toutes les 6 heures si nécessaire. (30 gouttes = 15 mg)

Lexomil® (bromazepam) 1,5 à 3 mg en sublingual toutes les 6 heures si nécessaire.

Xanax® (alprazolam) : 0.25 mg toutes les 6 heures si nécessaire.

SI LE TRAITEMENT EST INEFFICACE SUR LA SENSATION DE DYSPNÉE, AUGMENTER LES POSOLOGIES DE MORPHINE ET DE BENZODIAZÉPINE DE 30 À 50%

SI ÉTAT DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE ASPHYXIQUE, PROTOCOLE SPÉCIFIQUE

**Appuyez-vous si nécessaire sur l'EMSP de votre territoire**

<sup>1</sup> [opioconvert.fr](http://opioconvert.fr) site et application pour calculer les équivalences de doses entre les différents opioïdes et les différentes voies